



Døgnland til 5-hydroxyindolyacetat (5 HIAA)

Brúkast skal 2.5 l dunkur, sum inniheldur 100 ml Saltsýru 2,5%. Hesin fæst á Rannsóknarstovuni.

1. Lat vatnið t.d. kl.8 á morgni og koyr tað burtur
2. Samla síðan alt vatnið í dunkin til og við næsta morgun kl.8

Skriva klokktíð bæði tá byrjað og endað verður á bíleggingarseðilin. Fer okkurt til spillis er neyðugt at samla av nýggjum.

Meðan samlað verður, skal dunkurin helst goymast kalt. Lat ikki vatnið beinleiðis í dunkin, tí sýra er í dunkinum.

Dagin fyri at samlað verður, eigur tú ikki at hava etið/drukkið nakað, sum inniheldur serotonin:

ananas, avokado, banan, skimmelost, kiwifrukt, blommur, sjokulátu, tomatir, valnøtir, grønmeti, vín, spiritus

3 dagar frammanundan mást tú ikki hava tikið:

Hostamedicin, Acetylsalicylsýru, Atenolol, Fluorouracil, Imipramin, Isoniazid, Methenamin, Methyldopa, Monoaminoxidase-B-hæmmara, Napeoxen, Paracetamol, Tetracosactid, tiazider

Set strikukotu frá bíleggingarseðlinum á dunkin

Avlevera dunkin og bíleggingarseðilin á Rannsóknarstovuni, G0

- nýggja bygningi á LS